L'usage de la calculatrice est interdit. Les raisonnements présentés devront être soigneusement justifiés et détaillés, quelques points seront dédiés à la présentation, l'orthographe et la propreté de votre copie.

En particulier, il vous est demandé de souligner les résultats obtenus. Il n'est pas nécessaire de répondre à l'ensemble des questions pour avoir une bonne note.

Les deux questions précédées du symbole ★ sont très difficiles, vous pourrez les aborder uniquement si vous avez fini le reste.

Échauffement

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Factoriser $a^5 - 2^5$ par $a - 2$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=1}^n (2k + 3k^2)$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $P_n = \prod_{k=2}^{n+1} 3e^{2^k}$.

4. Calculer $S_n = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n \frac{j}{i}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

5. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $S_n = \sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right)$.

6. Pour x et y deux réels, on considère la proposition :

$$(P) : (x \neq -1 \text{ et } y \neq -1) \Rightarrow x + y + xy \neq -1$$

(a) Écrire la négation de (P) .

(b) Écrire la contraposée de (P) .

(c) Démontrer que la propriété (P) est vraie.

(d) L'équivalence est-elle vraie ?

7. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(y - f(x)) = 2 - x - y$$

Exercice : La suite de Fibonacci et nombre d'or

La suite de Fibonacci, notée (F_n) , est définie par :

$$\begin{cases} F_0 = 0 \\ F_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \end{cases}$$

1. Lien avec le nombre d'or.

- Calculer F_n pour $n \in \llbracket 2, 10 \rrbracket$.
- Démontrer par récurrence double que : $\forall n \geq 5, F_n \geq n$.
- En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = +\infty$.
- Expliciter le réel positif φ tel que $\varphi^2 = \varphi + 1$. Ce réel est appelé le nombre d'or.
- Montrer que l'autre solution de cette équation est $-\frac{1}{\varphi}$.
- Démontrer par récurrence double la formule de Binet :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - (-\varphi)^{-n} \right)$$

- Démontrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi$.

2. Premières formules sur la suite de Fibonacci.

- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi^n = F_n \varphi + F_{n-1}$.
- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n F_{2k+1} = F_{2n+2}$.
- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n F_{2k} = F_{2n+1} - 1$.
- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$.
- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n F_k^2 = F_n F_{n+1}$.

- Démontrer par récurrence double que : $\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$.

3. Irrationalité de φ . Démontrer que $\sqrt{5}$ est irrationnel, en déduire que le nombre d'or est irrationnel.

4. Un peu de Python.

- Écrire une fonction `listefib(n)` qui prend en paramètre un entier naturel n et renvoie la liste des n premiers nombres de Fibonacci. On utilisera pour cela la relation de récurrence double qui définit cette suite.
- Écrire une fonction `fib1(n)` qui prend en paramètre un entier naturel n et renvoie F_n . On utilisera uniquement deux variables entières dans le corps de la fonction.
- Écrire une fonction `fib2(n)` qui prend en paramètre un entier naturel n et renvoie F_n en utilisant la formule de Binet. Quel peut-être l'inconvénient de cette dernière fonction ?

5. ★ Théorème de Zeckendorf. Montrer que tout entier naturel non nul s'écrit de façon unique comme somme de nombres de Fibonacci non consécutifs.

Problème : Dénombrement de promenades

Ce problème concerne le dénombrement de chemins dans le plan ou dans l'espace. Les trois parties sont indépendantes. On rappelle que pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ s'interprète comme le nombre de façons de choisir k éléments dans un ensemble à n éléments.

Partie A : Échauffement en dimension 2

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Une souris se trouve initialement à l'origine, O , du repère et souhaite se rendre au point A de coordonnées (a, b) avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$. La souris n'a le droit de faire que des déplacements de vecteur $\vec{i}$ ou $\vec{j}$, c'est-à-dire qu'elle va vers la droite ou vers le haut mais qu'elle ne peut pas aller à gauche ou vers le bas.

- À l'aide de schémas, représenter tous les chemins possibles dans le cas particulier où $a = 2$ et $b = 3$.
- Démontrer que, dans le cas général, le nombre de chemins possibles pour la souris est $\binom{a+b}{a}$.
- ★ La souris doit aller du point O au point de coordonnées (a, a) avec $a \in \mathbb{N}$ avec la contrainte supplémentaire suivante : à chaque point du trajet de coordonnées (α, β) avec $\alpha \in \llbracket 0, a \rrbracket$ et $\beta \in \llbracket 0, a \rrbracket$, on doit avoir $\alpha \geq \beta$.
Montrer que le nombre de chemins vérifiant cette condition est : $\frac{1}{a+1} \binom{2a}{a}$.

Partie B : Promenades sur un cube

Une souris se déplace sur les arêtes d'un cube de longueur 1. Elle se trouve initialement au sommet A .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on s'intéresse au nombre de chemins de longueur n partant du sommet A et arrivant au sommet A , on note N_n ce nombre.

Le graphique ci-dessous représente un parcours possible pour $n = 8$. Le sommet de départ est A et la souris visite les sommets E, H, D, C, B, F, E , avant de revenir au sommet A .

Pour modéliser ces déplacements, on note :

- v un déplacement vertical, c'est-à-dire suivant les arêtes $[FG]$, $[EH]$, $[AD]$ et $[BC]$.
- h un déplacement horizontal, c'est-à-dire suivant les arêtes $[GH]$, $[FE]$, $[BA]$ et $[CD]$.
- p un déplacement en profondeur, c'est-à-dire suivant les arêtes $[GC]$, $[HD]$, $[FB]$ et $[EA]$.

Avec ces notations, le déplacement illustré dans l'exemple ci-dessus se code $pvphvphp$.

- Démontrer que si n est un entier naturel impair alors $N_n = 0$.
- Calculer N_1 , N_2 , N_3 et N_4 en explicitant le codage correspondant des chemins à l'aide des notations v , h et p .

3. On suppose que n est pair et s'écrit $n = 2q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

$$N_n = \sum_{k=0}^q \binom{2q}{2k} \sum_{l=0}^{q-k} \binom{2q-2k}{2l}$$

4. Le but de cette question est d'expliciter la somme précédente. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$.

(a) Donner une expression simple de $\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k$.

(b) Montrer que :

$$\sum_{i=0}^p \binom{2p}{2i} x^{2i} = \frac{(x+1)^{2p} + (-x+1)^{2p}}{2}$$

(c) En déduire que :

$$\sum_{k=0}^q \binom{2q}{2k} \sum_{l=0}^{q-k} \binom{2q-2k}{2l} = \frac{3^{2q} + 3}{4}$$

(d) En déduire une formule simple pour N_n pour $n \in \mathbb{N}^*$ et vérifier sa cohérence avec la question 2.

Partie C : Attention au chat

On considère une grille de taille $(n+1) \times (n+1)$. On repère chaque case par un couple $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$ de la façon détaillée ci-dessous dans le cas particulier où $n = 2$:

(0,2)	(1,2)	(2,2)
(0,1)	(1,1)	(2,1)
(0,0)	(1,0)	(2,0)

Un chat se trouve à la case de coordonnées $(0, 0)$ et une souris se trouve à la case de coordonnées (n, n) . Ils font des déplacements simultanément, le chat allant à droite ou en haut de façon équiprobable et la souris à gauche ou en bas de façon équiprobable. Si le chat se trouve sur la même case que la souris, il la mange et l'on note p_n la probabilité que le chat mange la souris. Voici la grille dans le cas où $n = 2$.

		Souris
Chat		

1. Calculer la probabilité que la souris soit mangée dans le cas $n = 2$, c'est-à-dire dans le cas où la grille est de taille 3×3 .

On va résoudre le problème en toute généralité dans le cas d'une grille de taille $(n+1) \times (n+1)$ où $n \in \mathbb{N}$.

2. Démontrer que si le chat et la souris se rencontrent, c'est sur une case de coordonnées $(i, n-i)$ où $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, démontrer que la probabilité pour que le chat aille sur la case $(i, n-i)$ est $\frac{1}{2^n} \binom{n}{i}$.

4. En déduire que $p_n = \frac{1}{4^n} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2$.

5. Démontrer que la probabilité trouvée précédemment peut se simplifier en $\frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$.

On pourra, par exemple, examiner le coefficient en facteur de x^n dans les membres de gauche et de droite de l'expression $(x+1)^{2n} = (x+1)^n (x+1)^n$.